

Važnost kondoma

Najbolji način zaštite od spolno prenosivih bolesti je kondom od lateksa. Uporaba kondoma mora biti ispravna.

Ljudska pogreška tijekom uporabe je češća i ozbiljnija od grešaka u samoj proizvodnji. Kondom ne smijete nositi u džepu jer može doći do termičkih i mehaničkih oštećenja. Uvijek treba upotrijebiti novi kondom tijekom bilo kojeg spolnog odnosa.

Najčešće se kondom ošteći s noktima ili zubima prilikom otvaranja. Postavlja se na penis u erekciji i prije bilo kakvog genitalnog dodira. Tijekom odnosa važno je održavati dovoljnu vlažnost. Treba upotrebljavati lubrificirajuća sredstva (kreme i gelove za podmazivanje) na bazi vode.

Testiranja se vrše u svim ginekološkim i dermatoveneroloskim abulantama, bilo javnim bilo privatnim ordinacijama i klinikama.

HUHIV

HRVATSKA UDRUGA ZA OBOLJELE OD HIV-a

Hrvatska udruža za oboljele od HIV-a
Medveščak 9, Zagreb
T: 01 / 4666 655
F: 01 / 4666 655
HIV SOS tel: 0800 448 767
info@huhiv.hr, www.huhiv.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI REPUBLIKE HRVATSKE

GONOREJA

HUHIV

HRVATSKA UDRUGA ZA OBOLJELE OD HIV-a

Što je gonoreja?

- spolno prenosiva infekcija koja najčešće zahvaća mokraćne i spolne organe
- uzročnik je bakterija *Neisseria gonorrhoeae* (gonokok)
- prenosi se s jednog zaraženog partnera na drugo (vaginalnim, analnim ili oralnim odnosom)

Inkubacija traje 2- 7 dana.

♀ Kod žena:

- infekcija može biti bez simptoma, no ponekad izaziva gnojni iscijedak iz rodnice (žuto-zeleni), bolno i učestalo mokrenje

♂ Kod muškaraca:

- infekcija izaziva gnojni (žuto-zeleni) iscijedak iz penisa uz bol i učestalo mokrenje

U oba spola, infekcija može zahvatiti i grlo ili stražnje crijevo (često bez simptoma, ali može se javiti svrbež, bol, iscijedak).

Simptomi

Liječenje

Gonoreja se uspješno liječi antibioticima, ali važno je da se dijagnosticira u ranoj fazi dok još nije došlo do upalne bolesti zdjelice kako bi liječenje bilo uspješnije i kako bi se izbjegla trajna oštećenja.